

Belirtileri



Tedavi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü --->>>
amblemi olacak



- 2-3 haftadan uzun süren öksürük
- Balgam çıkarma
- Ateş
- Gece terlemesi
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Halsizlik
- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- Göğüs ve sırt ağrısı
- Kan tükürmek




Bu belirtiler sizde varsa,
verem savaşı dispanserine, aile
hekiminize veya size en yakın başka
bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Tüberküloz, **TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN**
bir hastalıktır.

- ✓ Tüberküloz tedavisinde **ilaçların bir gün bile aksatılmaması** önemlidir.
- ✓ Tüberküloz hastalarının tedavisi için önerilen **tedavi yöntemi** Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasıdır.
- ✓ **Doğrudan gözetimli tedavi (DGT);** tüberküloz hastasının tüm tedavisi süresince ilaçlarının her bir dozunu bir görevli ya da sorumlu bir kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir.



TÜBERKÜLOZ (Verem)



**tedavi edilebilir
ve önlenabilir**
bir hastalıktır


--->>>

<http://www.thsk.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 6974cf81-6b48-4e34-bb1b-73c9635ec32a kodu ile erişebilirsiniz.


Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/> adresi yazılı olacak

TÜBERKÜLOZ (Verem)



- ✓ Tüberküloz **solunum yoluyla** akciğerlere giden verem mikrobulunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır.
- ✓ En sık akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir.
- ✓ Dünyada **her yıl yaklaşık 9 milyon insan** tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır.
- ✓ Zengin-fakir, genç-yaşlı **herkes** tüberküloz hastası olabilir.

Tüberküloz nasıl bulaşır?




Tüberküloz hastalığı;
tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen tüberküloz (verem) hastasından

- öksürme,
- hapşırma veya
- konuşma esnasında ortama yayılan ve verem mikrobu içeren *damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.*



Düzenli ilaç kullanan hastalar,
veremi bulaştırmaz.

Bulaşma nasıl önlenir?



- **Tüberküloz hastaları** ilaçlarını düzenli olarak (bir gün bile aksatmadan) kullanmalı ve doktorunun önerdiği süreyi tamamlamalıdır.
- **Öksürürken ve hapşırırken** ağız ve burunlarını mendille kapatmaları gerekir.
- **Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları** kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.



Tüberküloz tedavisinde kullanılan **ilaçlar,**
verem savaş dispanserlerinde **ücretsiz** olarak verilmektedir.